

Microvet[®] IM

Descripción: Gel antiséptico para uso intramamario.

Fórmula: Solución electroquímicamente activa de pH Neutro con especies activas de cloro y oxígeno al 0.0125%.

Descripción: Microvet[®] IM es un antiséptico intramamario, posee un amplio poder germicida gracias a su efecto oxidativo es capaz de eliminar el 99.999% de virus, bacterias y hongos que afectan a la glándula mamaria.

Indicaciones: Microvet[®] IM en casos de mastitis subclínica se aplican mínimo 3 veces al finalizar cada ordeña, administrar vía intramamaria en Vacas, Borregas y Cabras en producción bajo la supervisión de un Médico Veterinario

Características:

- NO REQUIERE PERÍODO DE RETIRO
- No es un antibiótico y debido a eso no genera resistencia microbiana
- Gracias a su pH neutro se puede aplicar en cualquier mucosa
- La aplicación es de fácil manejo

Mecanismo de acción: Microvet[®] IM elimina bacterias, virus y hongos al contacto, gracias a su poder oxidativo (partículas de cloro y oxígeno libres) que actúa sobre estructuras externas de los virus, bacterias y hongos provocando lisis osmótica.

El objetivo al utilizar Microvet[®] IM es disminuir el uso de antibióticos y evitar las pérdidas ocasionadas por bacterias como *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, coliformes, levaduras y hongos¹ que ocasionan fibrosis en la glándula mamaria.

Vía de administración: Intramamario

Modo de uso: Al finalizar la ordeña identificar a las vacas susceptibles, el pezón debe estar completamente limpio y desinfectado con Microvet[®] pecuario, acto seguido inserte la punta de la jeringa en el canal del pezón (debe tener cuidado de no contaminar la punta), presione el émbolo hasta que la totalidad del contenido de la jeringa haya salido, finalmente sumergir el pezón nuevamente Microvet[®] pecuario.

Dosis: Vacas en producción se debe aplicar 1 jeringa de Microvet® IM en cada cuarto a tratar después de la ordeña, mínimo 3 veces.

Borregas y Cabras se recomienda utilizar la mitad de la jeringa durante 2 a 3 días.

Advertencia: No exponer a la luz solar de forma directa, mantener el envase cerrado, no dejar al alcance de los niños o de los animales domésticos, para uso exclusivo en medicina veterinaria, eliminar el envase vacío de acuerdo a las normas ecológicas de la región.

Presentación: Cubeta con 25 jeringas cada una con 10 ml de gel antiséptico.

Fecha de caducidad:

Fabricado en México por Zurich Tec de México SA de CV
Lago Mayor #208, Col. Tamaulipas sección Virgencitas
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. De México
CP. 57300

Información:

Tel. 378 148 9184

Correo electrónico: contacto@zurichtecvet.com

1. *Agrovit. Mastitis: enfermedad y transmisión.*