

Microvêt[®] Pig Dosser

Descripción: Solución antiséptica de uso veterinario

Fórmula: Solución electroquímicamente activa con pH Neutro y especies activas de cloro y oxígeno al 0.008%.

Descripción: Microvêt[®] Pig Dosser es una solución antiséptica de amplio espectro de aplicación oral, diseñada para tratar de manera efectiva enfermedades causadas por microorganismos que afectan el tracto gastrointestinal de Cerdos y otras especies.

Indicaciones: Microvêt[®] Pig Dosser una solución antiséptica de aplicación oral como auxiliar en el manejo y tratamiento de la Diarrea Viral Porcina, Gastroenteritis transmisible (GET), Diarrea epidémica porcina (DEP), Rotavirus, Delta coronavirus y diarreas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella spp* y *Clostridium spp*.

Características:

- No arde
- No genera resistencia microbiológica
- Gracias a su pH neutro no es tóxico para los animales y para el personal
- La aplicación es de fácil manejo

Mecanismo de acción: elimina bacterias, virus y hongos al contacto, gracias a su poder oxidativo (partículas de cloro y oxígeno libres) que actúa sobre estructuras externas de los virus, bacterias y hongos provocando lisis osmótica.

Estudios recientes han demostrado que la carga microbiológica presente en una herida afecta significativamente las etapas de curación, al reducir la biopelícula se evita la incapacidad de superar la fase de inflamación, mantiene una humedad óptima logrando acelerar la curación de las heridas en comparación con los vendajes tradicionales, ayudando a regenerar los tejidos y los vasos sanguíneos.

Microvêt® Pig Dosser elimina los siguientes agentes patógenos:

Escherichia coli, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Salmonella spp*, Coronavirus (GET, DEP), Rotavirus, *Clostridium perfringens*, *Clostridium difficile* entre otros.

Vía de administración: Oral, para aplicar la dosis correspondiente auxiliarse del dosificador que tienen la botella.

Modo de uso: mediante la aplicación de **Microvêt® Pig Dosser** se logra una recuperación más rápida ya que se eliminan los microorganismos causantes de la infección logrando reducir la diarrea, no tiene efectos secundarios.

Dosis:

1. Lechones lactantes de hasta 10 días después del destete aplicar 3 mL 3 veces al día.
2. Cerdos adultos: aplicar 10 mL 3 veces al día.

Recordar que 1 mL equivale a 1 atomizado

Advertencia: No exponer a la luz solar de forma directa, mantener el envase cerrado, no dejar al alcance de los niños o de los animales domésticos, para uso exclusivo en medicina veterinaria, eliminar el envase vacío de acuerdo a las normas ecológicas de la región.

Presentación: 500 mL.

24 meses de vida útil

Fabricado en México por Zurich Tec de México SA de CV
Lago Mayor #208, Col. Tamaulipas sección Virgencitas
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. De México
CP. 57300

Información:

Tel. 378 148 9184

Correo electrónico: contacto@zurichtecvet.com